

病児保育室だより わかば 第 6 号

わかば病児室
看護師
H30年 6月 1日

寒かったり暑かったりと体調管理が大変な時期ですね。そして
はしか(麻疹)の情報も入ってきました。非常に感染が強く、
幼い子供が発症すると重症化するのぞ、注意が必要ですね。
今日は **はしか** について再度確認しておきましょう。

*** 潜伏期間**
10~12日

*** 登園停止期間**
解熱後 3日間

原因

麻疹ウイルス
主に空気感染、飛沫感染、接触感染。

定期予防接種

MR(麻疹・風疹混合)ワクチン

主な症状

- 鼻水、せき、目赤、発熱などが 1週間
のような症状がでる。
- 一度熱が下がった後再び高熱が出ると
同時に全身に1~2mm はん点のような発疹。
ほぼの内側にも白いはん点ができる。
- 4~5日、38℃前後の高熱が続き
せき、鼻水、目の充血などが続く。
- 一度下がった、生後免疫ができるまで
いわれている。

合併症

肺炎、中耳炎、脳炎など。



対応

春から初夏にかけて流行するといわれています。
高熱による脱水症状に注意します。たとえりでも
感染者が出たら、保護者全員に通知し同時に
予防接種の有無を確認し、未接種の子にもは
接種を強くすすめましょう。9か月以上の乳児が
未接種の状態で感染した場合、6日以内なら
発症をほぼ抑えられるとされるガンマグロブリン
製剤という注射もあります。ただし、免疫抑制剤の
医師から十分説明を受けてからにします。

家庭での注意点

1歳になったら必ずMRワクチン接種を
するように促しましょう。1歳時に1回目。
さらに就学前に2回目の接種をいっしょに。
発症した場合、ほかの重篤な合併症を
起こす可能性もあることを知ってもらいましょう。



先月の病児保育利用数と疾患

利用数	3名	疾患	突発性発疹の疑い、 感冒、 溶連菌感染
-----	----	----	---------------------------