

定期予防接種

定期予防接種の予診票は新生児訪問時に配布・説明をしています。転入の方は、保健福祉センター窓口へ母子健康手帳をご持参の上、お越しください。

予防接種は、個人の疾患の予防はもちろんですが、社会全体を感染症から守るという目的があります。定期予防接種は、接種努力をするよう義務付けられています（A類疾病）。積極的に接種をしましょう。

予防接種	種類	回数・接種量	対象者	接種回数・間隔
B型肝炎 H28.10.1 定期開始	3回 各0.25ml	平成28年4月1日以降に生まれた、生後1歳に至るまでの間にある者（1歳になる前日） 標準的接種期間：生後2～9月に至るまでの間	1回目 → 2回目 → 3回目 1回目接種後27日以上の間隔をあけて2回目を接種 1回目の接種から139日以上の間隔をあけて3回目を接種	
ヒブ 生後2～60月に至るまでの間 (生後2月になる前日から60月の前日まで)	4回 各0.5ml	標準的な接種開始年齢 ※なるべくこの時期に接種を開始しましょう。 ●生後2～7月に至るまで (生後2月になる前日から生後7月になる前日) 初回接種 3回 (生後12月までに) 追加接種 1回	【初回】 1回目 → 2回目 → 3回目 → 【追加】 4回目 1回目接種後27日以上(医師が認める場合は20日)の間隔をあけて2回目を接種 2回目接種後27日以上(医師が認める場合は20日)の間隔をあけて3回目を接種 初回(3回目)終了後7月以上の間隔をあけて4回目を接種 ※生後12月までに3回の初回接種を終了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が認める場合は20日)以上の間隔において1回接種。 《標準的には27日から56日までの間隔で接種》 《標準的には初回接種終了後7月から13月》	
			3回 各0.5ml 生後7～12月に至るまで (生後7月になる前日から生後12月になる前日) 初回接種 2回 (生後12月までに) 追加接種 1回 【初回】 1回目 → 2回目 → 【追加】 3回目 1回目接種後27日以上(医師が認める場合は20日)の間隔をあけて2回目を接種 初回(2回目)終了後7月以上の間隔をあけて3回目を接種 ※生後12月までに2回の初回接種を終了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が認める場合は20日)以上の間隔において1回接種。 《標準的には27日から56日までの間隔で接種》 《標準的には初回接種終了後7月から13月》	
	1回 0.5ml 生後12～60月に至るまで (1歳になる前日から5歳になる前日) 1回接種			
小児用肺炎球菌	4回 各0.5ml	標準的な接種開始年齢 ※なるべくこの時期に接種を開始しましょう。 ●生後2～7月に至るまで (生後2月になる前日から生後7月になる前日) 初回接種 3回 追加接種 1回	【初回】 1回目 → 2回目 → 3回目 → 【追加】 4回目 1回目の接種から27日以上の間隔をあけて(生後12月までに完了) 2回目の接種から27日以上の間隔をあけて(生後24月までに完了) 3回目接種から60日以上の間隔をあけて、生後12月以降に接種 ※初回2回目及び3回目は、生後24月に至るまでに接種することとし、それを超えた場合は行わない(追加接種は可能)。また、初回接種のうち2回目の接種は生後12月までに行うこととし、それを超えた場合は初回接種のうち3回目は行わない(追加接種は可能)。 《標準的には生後12月から15月》	
			3回 各0.5ml 生後7～12月に至るまで (生後7月になる前日から1歳になる前日) 初回接種 2回 追加接種 1回 【初回】 1回目 → 2回目 → 【追加】 3回目 1回目の接種から27日以上の間隔をあけて(生後24月までに完了) 2回目接種から60日以上の間隔をあけて、生後12月以降に接種 ※初回2回目は生後24月までに行い、それを超えてしまった場合は行わない(追加接種は可能)	
	2回 各0.5ml 生後12～24月に至るまで (1歳になる前日から2歳になる前日) 1回目 → 2回目 1回目接種から60日以上の間隔をあけて			
	1回 0.5ml 生後24～60月に至るまで (2歳になる前日から5歳になる前日) 1回接種			
四種混合(DPT-IPV) (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	4回 各0.5ml	生後3～90月に至るまでの間 (生後3月になる前日から7歳6ヵ月になる前日) 標準的接種期間： 1期 生後3～12月に達するまで 1期追加 1期初回(3回)終了後12月～18月までの間隔をおく	【1期初回】 1回目 → 2回目 → 【1期追加】 3回目 → 【1期追加】 4回目 1回目接種後20日以上の間隔を置いて2回目を接種 2回目接種後20日以上の間隔を置いて3回目を接種 3回目接種後6月以上の間隔を置いて接種 《標準的には20日から56日までの間隔で接種》 《標準的には初回終了後12から18月の間》	

不活化ワクチン（A類疾病）